


ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018
Cognome:	Nome:	Matricola:
Corso di laurea:		Test Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{-\sin(3x)-x^2}$.



2. Siano $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_1^2 f(x) dx = 2 \int_{-1}^1 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha: $\max_{x \in [1,2]} f(x) \geq 4 \min_{x \in [-1,1]} g(x)$; $\max_{x \in [1,2]} f(x) < 4 \min_{x \in [-1,1]} g(x)$; $\min_{x \in [1,2]} f(x) \geq 6 \max_{x \in [-1,1]} g(x)$; $\min_{x \in [1,2]} f(x) > 4 \max_{x \in [-1,1]} g(x)$.

3. Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(x^2) dx =$ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$; $-\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1 - \cos^2 t) \cos t dt$; $\int_0^{\pi} f(1 - \sin^2 t) \sin t dt$; $\int_0^{\pi} f(\sin^2 t) \sin t dt$.

4. Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq a_n \leq |b_n|$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge? Sì, può capitare; No, non può mai capitare; Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$; Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$.

5. Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(5x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_5 =$ $\frac{1}{\pi}$; $\frac{1}{2\pi}$; $-\frac{1}{\pi}$; 0.

6. L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |1+x|x$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: $\frac{17}{3}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{11}{3}$; 4.

7. L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n(\alpha + n) [\log(1 + \frac{\alpha}{n})]^3$ è convergente è: $\alpha \geq 0$; $\alpha = 0$; nessun valore; $\alpha > 0$.


8. Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_{-1}^{x-1} e^{-t^2} dt$ è convessa? nessun valore; $x \geq 1$; $0 \leq x \leq 1$; $x \geq 0$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018
Cognome:	Nome:	Matricola:
Corso di laurea:		Test Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_1^{x+1} e^{-t^2} dt$ è convessa?
 a $0 \leq x \leq 1$; b $x \geq 0$; c nessun valore; d $x \geq 1$.

2. Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{\sin(3x)-x^2}$.



3. L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |x-1|x$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: a $\frac{11}{3}$; b 4; c $\frac{17}{3}$; d $\frac{19}{3}$.

4. Siano $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_0^1 f(x) dx = 2 \int_1^3 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha: a $\min_{x \in [0,1]} f(x) \geq 6 \max_{x \in [1,3]} g(x)$; b $\min_{x \in [0,1]} f(x) > 4 \max_{x \in [1,3]} g(x)$;
 c $\max_{x \in [0,1]} f(x) \geq 4 \min_{x \in [1,3]} g(x)$; d $\max_{x \in [0,1]} f(x) < 4 \min_{x \in [1,3]} g(x)$.

5. L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^2}{n} \left[\sin\left(\frac{1}{n}\right) \right]^\alpha$ è convergente è:
 a nessun valore; b $\alpha > 0$; c $\alpha \geq 0$; d $\alpha = 0$.

6. Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(3x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_3 =$ a $-\frac{1}{\pi}$; b 0; c $\frac{1}{\pi}$; d $\frac{1}{2\pi}$.


7. Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(x^2) dx =$ a $-\int_0^\pi f(1 - \sin^2 t) \sin t dt$;
 b $\int_0^\pi f(\sin^2 t) \sin t dt$; c $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$; d $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1 - \cos^2 t) \cos t dt$.

8. Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq |a_n| \leq |b_n|$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ diverge e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge? a Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$; b Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$; c Sì, può capitare; d No, non può mai capitare.

ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018			
Cognome:		Nome:		Matricola:	
Corso di laurea:		Test	Es1	Es2	Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

- L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 - \cos(\sqrt{\alpha n})}{n^2} \left[\sin\left(\frac{1}{n}\right) \right]^{\alpha-1}$ è convergente è: a $\alpha = 0$; b nessun valore; c $\alpha > 0$; d $\alpha \geq 0$.
- Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(6x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_6 =$ a $\frac{1}{2\pi}$; b $-\frac{1}{\pi}$; c 0; d $\frac{1}{\pi}$.
- Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{-\sin(3x)-x^2}$.




- L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |x|(1+x)$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: a $\frac{19}{3}$; b $\frac{11}{3}$; c 4; d $\frac{17}{3}$.
- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq |a_n| \leq b_n$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ non converge e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge? a No, non può mai capitare; b Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$; c Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$; d Sì, può capitare.
- Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_{-1}^{x-1} e^{-t^2} dt$ è convessa? a $x \geq 1$; b $0 \leq x \leq 1$; c $x \geq 0$; d nessun valore.
- Siano $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_1^2 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha: a $\max_{x \in [-1,1]} f(x) < \min_{x \in [1,2]} g(x)$; b $\min_{x \in [-1,1]} f(x) \geq 2 \max_{x \in [1,2]} g(x)$; c $\min_{x \in [-1,1]} f(x) > \max_{x \in [1,2]} g(x)$; d $\max_{x \in [-1,1]} f(x) \geq \min_{x \in [1,2]} g(x)$.
- Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(1-x^2) dx =$ a $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1 - \cos^2 t) \cos t dt$; b $\int_0^{\pi} f(1 - \sin^2 t) \sin t dt$; c $\int_0^{\pi} f(\sin^2 t) \sin t dt$; d $-\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018
Cognome:	Nome:	Matricola:
Corso di laurea:		Test Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq a_n \leq b_n$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ non converge e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge? a Sì, può capitare; b No, non può mai capitare; c Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$; d Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$.
- Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_{-1}^{-x-1} e^{-t^2} dt$ è convessa? a nessun valore; b $x \geq 1$; c $0 \leq x \leq 1$; d $x \geq 0$.
- Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(3x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_3 =$ a $\frac{1}{\pi}$; b $\frac{1}{2\pi}$; c $-\frac{1}{\pi}$; d 0.
- Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{\sin(3x)-x^2}$.



- Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(x^2) dx =$ a $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$; b $-\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1 - \cos^2 t) \cos t dt$; c $\int_0^{\pi} f(1 - \sin^2 t) \sin t dt$; d $\int_0^{\pi} f(\sin^2 t) \sin t dt$.
- L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^2}{n} \left[\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\alpha}$ è convergente è: a $\alpha \geq 0$; b $\alpha = 0$; c nessun valore; d $\alpha > 0$.
- L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |1+x|x$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: a $\frac{17}{3}$; b $\frac{19}{3}$; c $\frac{11}{3}$; d 4.
- Siano $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_1^2 f(x) dx = 2 \int_{-1}^1 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha: a $\max_{x \in [1,2]} f(x) \geq 4 \min_{x \in [-1,1]} g(x)$; b $\max_{x \in [1,2]} f(x) < 4 \min_{x \in [-1,1]} g(x)$; c $\min_{x \in [1,2]} f(x) \geq 6 \max_{x \in [-1,1]} g(x)$; d $\min_{x \in [1,2]} f(x) > 4 \max_{x \in [-1,1]} g(x)$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018			
Cognome:		Nome:		Matricola:	
Corso di laurea:		Test	Es1	Es2	Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.


1. L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |x|(1+x)$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: a $\frac{19}{3}$; b $\frac{11}{3}$; c 4; d $\frac{17}{3}$.

2. Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(1-x^2)dx =$ a $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1-\cos^2 t) \cos t dt$;
 b $\int_0^\pi f(1-\sin^2 t) \sin t dt$; c $\int_0^\pi f(\sin^2 t) \sin t dt$; d $-\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$.

3. Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq a_n \leq b_n$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$ non converge e $\sum_{n=0}^\infty b_n$ converge? a No, non può mai capitare; b Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$;
 c Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$; d Sì, può capitare.

4. L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{2-\cos(\sqrt{\alpha n})}{n^2} \left[\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\alpha-1}$ è convergente è: a $\alpha = 0$; b nessun valore; c $\alpha > 0$; d $\alpha \geq 0$.

5. Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{-\sin(2x)-3x^2}$.



6. Siano $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_1^2 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha: a $\max_{x \in [-1,1]} f(x) < \min_{x \in [1,2]} g(x)$; b $\min_{x \in [-1,1]} f(x) \geq 2 \max_{x \in [1,2]} g(x)$;
 c $\min_{x \in [-1,1]} f(x) > \max_{x \in [1,2]} g(x)$; d $\max_{x \in [-1,1]} f(x) \geq \min_{x \in [1,2]} g(x)$.


7. Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_{-1}^{-x-1} e^{-t^2} dt$ è convessa? a $x \geq 1$; b $0 \leq x \leq 1$; c $x \geq 0$; d nessun valore.

8. Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^\infty [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(6x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_6 =$ a $\frac{1}{2\pi}$; b $-\frac{1}{\pi}$; c 0; d $\frac{1}{\pi}$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018
Cognome:	Nome:	Matricola:
Corso di laurea:		Test Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.





- Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(4x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_4 =$ 0; $\frac{1}{\pi}$; $\frac{1}{2\pi}$; $-\frac{1}{\pi}$.
- L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |x|(x-1)$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: 4; $\frac{17}{3}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{11}{3}$.
- Siano $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_1^3 f(x) dx = 2 \int_0^1 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha:
 $\min_{x \in [1,3]} f(x) > \max_{x \in [0,1]} g(x)$; $\max_{x \in [1,3]} f(x) \geq \min_{x \in [0,1]} g(x)$; $\max_{x \in [1,3]} f(x) < \min_{x \in [0,1]} g(x)$;
 $\min_{x \in [1,3]} f(x) \geq 2 \max_{x \in [0,1]} g(x)$.
- Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(1-x^2) dx =$ $-\int_0^{\pi} f(\sin^2 t) \sin t dt$;
 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$; $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1-\cos^2 t) \cos t dt$; $\int_0^{\pi} f(1-\sin^2 t) \sin t dt$.
- Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_1^{1-x} e^{-t^2} dt$ è convessa?
 $x \geq 0$; nessun valore; $x \geq 1$; $0 \leq x \leq 1$.
- Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{\sin(2x)-3x^2}$.



- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq |a_n| \leq b_n$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ non converge e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge? a) Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$; b) Sì, può capitare; c) No, non può mai capitare; d) Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$.
- L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n(1+\alpha n) \arctan\left(\frac{1}{n^3}\right)$ è convergente è: a) $\alpha > 0$; b) $\alpha \geq 0$; c) $\alpha = 0$; d) nessun valore.

ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018	
Cognome:	Nome:	Matricola:	
Corso di laurea:		Test	Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(1-x^2)dx = \boxed{a} - \int_0^\pi f(\sin^2 t) \sin t dt$;
 ~~$\boxed{b} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$~~ ; $\boxed{c} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1-\cos^2 t) \cos t dt$; $\boxed{d} \int_0^\pi f(1-\sin^2 t) \sin t dt$.
2. L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^\infty n(\alpha+n) [\log(1+\frac{\alpha}{n})]^3$ è convergente è: $\boxed{a} \alpha > 0$; $\boxed{b} \alpha \geq 0$; $\boxed{c} \alpha = 0$; ~~\boxed{d} nessun valore.~~
3. Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_1^{x+1} e^{-t^2} dt$ è convessa?
 $\boxed{a} x \geq 0$; ~~\boxed{b} nessun valore;~~ $\boxed{c} x \geq 1$; $\boxed{d} 0 \leq x \leq 1$.
4. Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^\infty [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(5x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_5 =$ ~~$\boxed{a} 0$~~ ; $\boxed{b} \frac{1}{\pi}$; $\boxed{c} \frac{1}{2\pi}$; $\boxed{d} -\frac{1}{\pi}$.
5. Siano $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_1^3 f(x) dx = 2 \int_0^1 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha:
 $\boxed{a} \min_{x \in [1,3]} f(x) > \max_{x \in [0,1]} g(x)$; ~~$\boxed{b} \max_{x \in [1,3]} f(x) \geq \min_{x \in [0,1]} g(x)$~~ ; $\boxed{c} \max_{x \in [1,3]} f(x) < \min_{x \in [0,1]} g(x)$;
 $\boxed{d} \min_{x \in [1,3]} f(x) \geq 2 \max_{x \in [0,1]} g(x)$.
6. Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq a_n \leq |b_n|$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^\infty a_n$ diverge e $\sum_{n=0}^\infty b_n$ converge? \boxed{a} Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$; ~~\boxed{b} Sì, può capitare;~~ \boxed{c} No, non può mai capitare; \boxed{d} Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$.
7. Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{-\sin(2x)-3x^2}$.
- \boxed{a}  ; ~~\boxed{b} ~~ ; \boxed{c}  ; \boxed{d} 

8. L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |x-1|x$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: $\boxed{a} 4$; ~~$\boxed{b} \frac{17}{3}$~~ ; $\boxed{c} \frac{19}{3}$; $\boxed{d} \frac{11}{3}$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Seconda prova intermedia		10 gennaio 2018
Cognome:	Nome:	Matricola:
Corso di laurea:		Test Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

- Siano $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue e strettamente positive, e sia $\int_0^1 f(x) dx = 2 \int_1^3 g(x) dx$. Allora per qualunque coppia di funzioni che soddisfi a queste condizioni si ha: a $\min_{x \in [0,1]} f(x) \geq 6 \max_{x \in [1,3]} g(x)$; b $\min_{x \in [0,1]} f(x) > 4 \max_{x \in [1,3]} g(x)$; c $\max_{x \in [0,1]} f(x) \geq 4 \min_{x \in [1,3]} g(x)$; d $\max_{x \in [0,1]} f(x) < 4 \min_{x \in [1,3]} g(x)$.
- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $0 \leq |a_n| \leq |b_n|$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Può avverarsi la seguente circostanza: $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ diverge e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge? a Sì, può capitare, ma solo se $|a_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|b_n|$; b Sì, può capitare, ma solo se $|b_n|$ è infinitesimo di ordine superiore a $|a_n|$; c Sì, può capitare; d No, non può mai capitare.
- L'insieme dei valori del parametro $\alpha \geq 0$ per cui la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n(1 + \alpha n) \arctan\left(\frac{1}{n^3}\right)$ è convergente è: a nessun valore; b $\alpha > 0$; c $\alpha \geq 0$; d $\alpha = 0$.
- Qual è l'insieme dei valori $x \geq 0$ per cui la funzione $F(x) = \int_1^{1-x} e^{-t^2} dt$ è convessa? a $0 \leq x \leq 1$; b $x \geq 0$; c nessun valore; d $x \geq 1$.
- L'area compresa fra il grafico della funzione $f(x) = |x|(x - 1)$ e l'asse x delle ascisse per $x \in [-2, 2]$ è: a $\frac{11}{3}$; b 4; c $\frac{17}{3}$; d $\frac{19}{3}$.
- Sia f una funzione continua in \mathbf{R} . Allora $\int_{-1}^1 f(x^2) dx =$ a $-\int_0^{\pi} f(1 - \sin^2 t) \sin t dt$; b $\int_0^{\pi} f(\sin^2 t) \sin t dt$; c $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\cos^2 t) \cos t dt$; d $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(1 - \cos^2 t) \cos t dt$.
- Sia $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ la serie di Fourier della funzione $f(x) = \sin^2(4x)$ nell'intervallo $(-\pi, \pi)$. Allora $a_4 =$ a $-\frac{1}{\pi}$; b 0; c $\frac{1}{\pi}$; d $\frac{1}{2\pi}$.
- Indicate quale delle seguenti figure rappresenta il grafico vicino all'origine del polinomio di Taylor di secondo grado associato alla funzione $e^{\sin(2x) - 3x^2}$.

