


ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016	
Cognome:	Nome:	Matricola:	
Corso di laurea:		Test	Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(1 - \cos x - 2x)$ per x vicino a 0?



2. L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z + 2 + i| \leq 1$ e $|z + 1 + i| \geq 3$ è:
 a un cerchio; b un punto; c l'insieme vuoto; d una corona circolare.

3. Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_1(x_0) = a$, allora è sempre vero che: a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito; b f è discontinua in x_0 ; c f è continua da sinistra in x_0 ; d f è continua da destra in x_0 .

4. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente. Allora è sempre vero che:

a $f + g$ è crescente; b $f \circ g$ è crescente; c $g \circ f$ è crescente; d $f - g$ è crescente.

5. Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = -1/2$ e $f(1) = -1/2$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?

a $q(x) = 1 - x^5$; b $q(x) = 4 + 4x^3$; c $q(x) = 2x^3 + x^4$; d $q(x) = x^5 - 2$.

6. Siano $g(y) = \frac{1-y}{2+y^2}$, $f(x) = e^{2x} - 1$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a $-e$; b $2e$; c -1 ; d 2 .

7. Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + 2)$ nell'intervallo $[0, 2]$ sono:

a $\min = \log(\frac{5}{3})$, $\max = \log(\frac{5}{2})$; b $\min = 0$, $\max = \log(\frac{11}{6})$; c $\min = \log 2$, $\max = \log(\frac{17}{6})$; d $\min = \log(\frac{7}{6})$, $\max = \log 2$.


8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\frac{x-1}{4x^2})}{\cos(\frac{1}{x}) - 2} (2x + 1) =$ a $\frac{3}{2}$; b $-\frac{1}{2}$; c $\frac{1}{2}$; d $-\frac{3}{2}$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016			
Cognome:	Nome:	Matricola:			
Corso di laurea:		Test	Es1	Es2	Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\frac{x-1}{x^2})}{1 + \cos(\frac{1}{x^2})} (3x+1) =$ a $\frac{1}{2}$; b $-\frac{3}{2}$; c $\frac{3}{2}$; d $-\frac{1}{2}$.

2. Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(2 \log(1-x))$ per x vicino a 0?



3. Siano $g(y) = e^{2y} - 1$, $f(x) = \frac{1-x}{2+x^2}$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a -1; b 2; c -e; d 2e.

4. L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z - 2 - i| \leq 1$ e $|z - 1 - i| \leq 2$ è:
 a l'insieme vuoto; b una corona circolare; c un cerchio; d un punto.

5. Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + 1)$ nell'intervallo $[1, 3]$ sono:
 a min = $\log 2$, max = $\log(\frac{17}{6})$; b min = $\log(\frac{7}{6})$, max = $\log 2$; c min = $\log(\frac{5}{3})$, max = $\log(\frac{5}{2})$; d min = 0, max = $\log(\frac{11}{6})$.

6. Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = 1$ e $f(1) = 9$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?
 a $q(x) = 2x^3 + x^4$; b $q(x) = x^5 - 2$; c $q(x) = 1 - x^5$; d $q(x) = 4 + 4x^3$.

7. Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_1(x_0) = f_2(x_0)$, allora è sempre vero che: a f è continua da sinistra in x_0 ; b f è continua da destra in x_0 ; c $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito; d f è discontinua in x_0 .

8. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente. Allora è sempre vero che:
 a $g \circ f$ è crescente; b $f - g$ è crescente; c $f + g$ è crescente; d $f \circ g$ è crescente.

ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016			
Cognome:	Nome:	Matricola:			
Corso di laurea:		Test	Es1	Es2	Es3


- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{8}{3}x^3 + 6x^2 + 4x + 2)$ nell'intervallo $[-1, 0]$ sono:
 a min = 0, max = $\log(\frac{11}{6})$; b min = $\log 2$, max = $\log(\frac{17}{6})$; c min = $\log(\frac{7}{6})$, max = $\log 2$; d min = $\log(\frac{5}{3})$, max = $\log(\frac{5}{2})$.

2. Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = 3$ e $f(1) = 5$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?

a $q(x) = 4 + 4x^3$; b $q(x) = 2x^3 + x^4$; c $q(x) = x^5 - 2$; d $q(x) = 1 - x^5$.

3. Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(e^{x^2} - 1 + 3x)$ per x vicino a 0?



4. Siano $g(y) = 1 - e^{3y}$, $f(x) = \frac{1-2x}{3-x^2}$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a $2e$; b -1 ; c 2 ; d $-e$.

5. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente. Allora è sempre vero che:

a $f \circ g$ è crescente; b $g \circ f$ è crescente; c $g - f$ è crescente; d $f + g$ è crescente.

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \cos(\frac{1}{x^2})}{\sin(\frac{x+1}{x^3})} \frac{1}{2x^2 + 1} =$ a $-\frac{1}{2}$; b $\frac{1}{2}$; c $-\frac{3}{2}$; d $\frac{3}{2}$.

7. L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z + 2 + i| \leq 1$ e $|z + 1 + i| \geq 3$ è:

a un punto; b l'insieme vuoto; c una corona circolare; d un cerchio.

8. Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_1(x_0) \neq f_2(x_0)$, allora è sempre vero che: a f è discontinua in x_0 ; b f è continua da sinistra in x_0 ; c f è continua da destra in x_0 ; d $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito.

ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016
Cognome:	Nome:	Matricola:
Corso di laurea:		Test Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente. Allora è sempre vero che:


a $f + g$ è crescente; b $f \circ g$ è crescente; c $g \circ f$ è crescente; d $f - g$ è crescente.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cos(\frac{1}{x}) - 1}{\sin(\frac{x}{3x^2+1})} \frac{1}{1-2x} =$ a $\frac{3}{2}$; b $-\frac{1}{2}$; c $\frac{1}{2}$; d $-\frac{3}{2}$.

3. Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = -2$ e $f(1) = -3$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?

a $q(x) = 1 - x^5$; b $q(x) = 4 + 4x^3$; c $q(x) = 2x^3 + x^4$; d $q(x) = x^5 - 2$.

4. Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(2 \log(1 - x))$ per x vicino a 0?



5. Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_1(x_0) = f_2(x_0)$, allora è sempre vero che: a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito; b f è discontinua in x_0 ; c f è continua da sinistra in x_0 ; d f è continua da destra in x_0 .

6. Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + 1)$ nell'intervallo $[1, 3]$ sono:
 a $\min = \log(\frac{5}{3})$, $\max = \log(\frac{5}{2})$; b $\min = 0$, $\max = \log(\frac{11}{6})$; c $\min = \log 2$, $\max = \log(\frac{17}{6})$; d $\min = \log(\frac{7}{6})$, $\max = \log 2$.

7. Siano $g(y) = \frac{1-2y}{3-y^2}$, $f(x) = 1 - e^{3x}$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a $-e$; b $2e$; c -1 ; d 2 .

8. L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z + 2 - i| \geq 1$ e $|-2z - 4 + 2i| \leq 4$ è:
 a un cerchio; b un punto; c l'insieme vuoto; d una corona circolare.

ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016			
Cognome:	Nome:	Matricola:			
Corso di laurea:		Test	Es1	Es2	Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Siano $g(y) = \frac{1-2y}{3-y^2}$, $f(x) = 1 - e^{3x}$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a $2e$; b -1 ; c 2 ; d $-e$.

2. Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_2(x_0) = a$, allora è sempre vero che: a f è discontinua in x_0 ; b f è continua da sinistra in x_0 ; c f è continua da destra in x_0 ; d $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito.


3. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente. Allora è sempre vero che:

a $f \circ g$ è crescente; b $g \circ f$ è crescente; c $g - f$ è crescente; d $f + g$ è crescente.

4. Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{8}{3}x^3 + 6x^2 + 4x + 2)$ nell'intervallo $[-1, 0]$ sono:

a $\min = 0$, $\max = \log(\frac{11}{6})$; b $\min = \log 2$, $\max = \log(\frac{17}{6})$; c $\min = \log(\frac{7}{6})$, $\max = \log 2$; d $\min = \log(\frac{5}{3})$, $\max = \log(\frac{5}{2})$.

5. Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(e^{x^2} - 1 + 3x)$ per x vicino a 0?



6. L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z + 2 - i| \geq 1$ e $|-2z - 4 + 2i| \leq 4$ è:

a un punto; b l'insieme vuoto; c una corona circolare; d un cerchio.

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cos(\frac{1}{x}) - 1}{\sin(\frac{x}{3x^2+1})} \frac{1}{1-2x} =$ a $-\frac{1}{2}$; b $\frac{1}{2}$; c $-\frac{3}{2}$; d $\frac{3}{2}$.

8. Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = -2$ e $f(1) = -3$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?

a $q(x) = 4 + 4x^3$; b $q(x) = 2x^3 + x^4$; c $q(x) = x^5 - 2$; d $q(x) = 1 - x^5$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016	
Cognome:	Nome:	Matricola:	
Corso di laurea:		Test	Es1 Es2 Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = 3$ e $f(1) = 5$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?

a $q(x) = x^5 - 2$; b $q(x) = 1 - x^5$; c $q(x) = 4 + 4x^3$; d $q(x) = 2x^3 + x^4$.

2. Siano $g(y) = 1 - e^{3y}$, $f(x) = \frac{1-2x}{3-x^2}$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a 2; b $-e$; c $2e$; d -1 .

3. L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z - 2 + i| \leq 1$ e $|z + 1 + i| \leq 2$ è:

a una corona circolare; b un cerchio; c un punto; d l'insieme vuoto.

4. Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione


$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_1(x_0) \neq f_2(x_0)$, allora è sempre vero che: a f è continua da destra in x_0 ;

b $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito; c f è discontinua in x_0 ; d f è continua da sinistra in x_0 .

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \cos(\frac{1}{x^2})}{\sin(\frac{x+1}{x^3})} \frac{1}{2x^2 + 1} =$ a $-\frac{3}{2}$; b $\frac{3}{2}$; c $-\frac{1}{2}$; d $\frac{1}{2}$.

6. Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(\log(1 + 2x))$ per x vicino a 0?



7. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente. Allora è sempre vero che:

a $g - f$ è crescente; b $f + g$ è crescente; c $f \circ g$ è crescente; d $g \circ f$ è crescente.

8. Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{8}{3}x^3 - 6x^2 + 4x + 1)$ nell'intervallo $[0, 1]$ sono:

a $\min = \log(\frac{7}{6})$, $\max = \log 2$; b $\min = \log(\frac{5}{3})$, $\max = \log(\frac{5}{2})$; c $\min = 0$, $\max = \log(\frac{11}{6})$; d $\min = \log 2$, $\max = \log(\frac{17}{6})$.

ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016			
Cognome:	Nome:	Matricola:			
Corso di laurea:		Test	Es1	Es2	Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

1. Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}$, $a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_1(x_0) = a$, allora è sempre vero che: a f è continua da destra in x_0 ; b $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito; c f è discontinua in x_0 ; d f è continua da sinistra in x_0 .

2. Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + 2)$ nell'intervallo $[0, 2]$ sono:
 a $\min = \log(\frac{7}{6})$, $\max = \log 2$; b $\min = \log(\frac{5}{3})$, $\max = \log(\frac{5}{2})$; c $\min = 0$, $\max = \log(\frac{11}{6})$; d $\min = \log 2$, $\max = \log(\frac{17}{6})$.


3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\frac{x-1}{4x^2})}{\cos(\frac{1}{x}) - 2} (2x + 1) =$ a $-\frac{3}{2}$; b $\frac{3}{2}$; c $-\frac{1}{2}$; d $\frac{1}{2}$.

4. Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = -1/2$ e $f(1) = -1/2$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?
 a $q(x) = x^5 - 2$; b $q(x) = 1 - x^5$; c $q(x) = 4 + 4x^3$; d $q(x) = 2x^3 + x^4$.

5. L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z - 2 + i| \leq 1$ e $|z + 1 + i| \leq 2$ è:
 a una corona circolare; b un cerchio; c un punto; d l'insieme vuoto.

6. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente. Allora è sempre vero che:
 a $g - f$ è crescente; b $f + g$ è crescente; c $f \circ g$ è crescente; d $g \circ f$ è crescente.

7. Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(1 - \cos x - 2x)$ per x vicino a 0?



8. Siano $g(y) = e^{2y} - 1$, $f(x) = \frac{1-x}{2+x^2}$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a 2; b $-e$; c $2e$; d -1 .

ANALISI MATEMATICA 1 - Terzo appello		14 giugno 2016			
Cognome:	Nome:	Matricola:			
Corso di laurea:		Test	Es1	Es2	Es3

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- Per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Risposta corretta: +1.5. Risposta errata: -0.25.

- L'insieme dei numeri complessi che soddisfa $|z - 2 - i| \leq 1$ e $|z - 1 - i| \leq 2$ è:
 a l'insieme vuoto; b una corona circolare; c un cerchio; d un punto.
- Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione crescente e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione decrescente. Allora è sempre vero che:
 a $g \circ f$ è crescente; b $f - g$ è crescente; c $f + g$ è crescente; d $f \circ g$ è crescente.
- Il valore minimo e il valore massimo della funzione $f(x) = \log(\frac{8}{3}x^3 - 6x^2 + 4x + 1)$ nell'intervallo $[0, 1]$ sono:
 a $\min = \log 2, \max = \log(\frac{17}{6})$; b $\min = \log(\frac{7}{6}), \max = \log 2$; c $\min = \log(\frac{5}{3}), \max = \log(\frac{5}{2})$; d $\min = 0, \max = \log(\frac{11}{6})$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\frac{x-1}{x^2})}{1 + \cos(\frac{1}{x^2})} (3x + 1) =$ a $\frac{1}{2}$; b $-\frac{3}{2}$; c $\frac{3}{2}$; d $-\frac{1}{2}$.
- Siano $g(y) = \frac{1-y}{2+y^2}, f(x) = e^{2x} - 1$. Allora $(g \circ f)'(0) =$ a -1 ; b 2 ; c $-e$; d $2e$.
- Siano $f_1, f_2 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ due funzioni continue, $x_0 \in \mathbf{R}, a \in \mathbf{R}$, e si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ a & \text{se } x = x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

Se $f_2(x_0) = a$, allora è sempre vero che: a f è continua da sinistra in x_0 ; b f è continua da destra in x_0 ; c $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste finito; d f è discontinua in x_0 .

- Sia f un funzione continua in $[-1, 1]$ tale che $f(-1) = 1$ e $f(1) = 9$. Per quale funzione $q(x)$ l'equazione $f(x) = q(x)$ ha sicuramente almeno una soluzione in $[-1, 1]$?
 a $q(x) = 2x^3 + x^4$; b $q(x) = x^5 - 2$; c $q(x) = 1 - x^5$; d $q(x) = 4 + 4x^3$.
- Quale delle figure rappresenta il grafico del polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di grado 2 della funzione $f(x) = \sin(\log(1 + 2x))$ per x vicino a 0?

